

ОТРАВЛЕНИЕ СУРРОГАТАМИ АЛКОГОЛЯ

- РАЗНОВИДНОСТИ АЛКОГОЛЬНЫХ СУРРОГАТОВ.
- КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОТРАВЛЕНИЯ СУРРОГАТАМИ.
- ПРИЗНАКИ ИНТОКСИКАЦИИ СПИРТСОДЕРЖАЩИМИ СУРРОГАТАМИ.
- СИМПТОМАТИКА ОТРАВЛЕНИЯ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ.
- ОТРАВЛЕНИЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ.
- СПЕЦИФИКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СУРРОГАТАМИ.
- АЛГОРИТМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОТЕРПЕВШЕМУ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В СОЗНАНИИ.
- ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОТРАВЛЕНИЯ В БОЛЬНИЦЕ.

Разновидности алкогольных суррогатов:


Жидкости, содержащие этанол:	Отсутствие этилового спирта:
спирт бутиловый	К суррогатам второй группы относятся такие вещества, как этиленгликоль и метиловый спирт. Если человек отравился подобными напитками, сразу возникает клиническая картина интоксикации. В данной ситуации потребуются неотложная помощь медиков, иначе человек просто погибнет.
технический спирт (денатурат) - содержит альдегид и древесный спирт	
сульфитный и гидролизный спирты – их получают из древесины	
разнообразные лосьоны, одеколоны – в составе имеется не менее 60 % этанола	
морилка наряду с этиловым спиртом содержит красители	
политура включает несколько разновидностей токсичных спиртов.	

Клиническая картина отравления суррогатами

Симптоматика отравления зависит от того, какой именно суррогат алкоголя выпил пострадавший. Если это вещество относится к спиртосодержащим, то клиническая картина будет более благоприятной. Что касается отравления метиловым спиртом либо этиленгликолем, то признаки интоксикации проявляются гораздо тяжелее. В любом случае понадобится неотложная помощь медиков, так как самостоятельно спасти пострадавшего просто нереально.

Признаки интоксикации спиртосодержащими суррогатами:

- чрезмерная потливость;
- повышенное двигательное и эмоциональное возбуждение человека, эйфория;
- краснота лица;
- чрезмерное продуцирование и выделение слюны;
- чувство физического, психического расслабления.



Симптоматика отравления метиловым спиртом

- повышение температуры тела до 38 градусов;
- рвота и тошнота;
- нарушения зрения: черные точки перед глазами, диплопия, иногда развивается слепота; зрачки сильно расширены;
- чрезмерная сухость слизистых оболочек и кожных покровов;
- через два дня после отравления может появиться ломота в суставах и мышцах, боли в области живота и поясницы;
- понижается уровень артериального давления;
- нарушается ритм сердцебиения;
- сознание становится спутанным;
- возникают судороги на фоне сильного возбуждения;
- развивается паралич конечностей.

При отсутствии лечения пострадавший впадает в кому; далее возможен смертельный исход.

Отравление этиленгликолем.

Клиническое развитие симптомов отравления происходит поэтапно:

- **Ранний период – длится не менее двенадцати часов, для него присущи симптомы опьянения и довольно удовлетворительное самочувствие больного.**
- **Токсическое поражение нервной системы. Наблюдаются такие признаки, как рвота, тошнота, жажда, головная боль, «синюшность» кожных покровов и слизистых, понос. Расширяются зрачки; развивается тахикардия; дыхание становится затрудненным; заметно повышается температура тела. Возможны судороги и потеря сознания.**
- **Нефро- и гепатотоксический период характеризуется развитием печеночной, почечной недостаточности (через 2-5 дней после приёма этиленгликоля). Возникает желтушность склер и кожи, в том числе ладоней. Развивается кожный зуд, моча темнеет. Почечная недостаточность проявляется сниженным диурезом или же его полным отсутствием.**

Специфика первой помощи при отравлении суррогатами.

Если имеется подозрение на отравление алкогольными суррогатами, важна срочная и неотложная врачебная помощь. Именно от этого будет зависеть дальнейшее состояние и жизнь пострадавшего.

В том случае, если отсутствует сознание, пострадавшего **необходимо уложить на твердую и обязательно ровную поверхность, голову повернуть набок**, иначе может произойти аспирация собственной рвотой. После этого без промедления **следует вызвать бригаду «неотложки»**.

При нарушении сердечной, дыхательной деятельности проводят искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.



Если потерпевший находится в сознании, то алгоритм первой помощи выглядит следующим образом:

- прием сорбента;
- прием солевого слабительного (сульфата магнезии);
- можно дать больному обволакивающий отвар, кисель;
- экстренно госпитализировать в ближайшую больницу.

Особенности лечения отравления в больнице:

- промывание желудка с помощью зонда продолжается в течение трех суток, затем применяются сорбенты;
- антидотом суррогатов является 5% этиловый спирт. Он вводится внутривенно капельно. В случае легкой формы интоксикации пострадавшему дают 30% спирт этиловый внутрь;
- при отравлении этиленгликолем внутривенно вводят глюконат кальция, который нейтрализует продукты распада ядовитого вещества;
- осуществляется форсированный диурез (при отсутствии почечной недостаточности);
- методом гемодиализа проводится выведение токсических веществ из крови;
- если причиной интоксикации является метиловый спирт, нужно проводить спинномозговые пункции для снижения внутричерепного давления;
- кроме всего перечисленного, больному вводят внутривенно новокаин с глюкозой, преднизолон, витамины В и С;
- при тяжелой форме интоксикации этиленгликолем может потребоваться пересадка почки.

ПРОФИЛАКТИКА

Самым лучшим способом профилактики будет полный отказ от употребления алкоголя. Но даже без этого можно оградить себя от опасности:

- 1. Обращайте внимание на цену спиртных напитков. Слишком низкая цена — первый признак низкого качества.**
- 2. Приобретайте алкогольные напитки только в проверенных местах — специализированных магазинах или крупных супермаркетах.**
- 3. В хорошей водке не бывает осадка. Если при встряхивании тары появляются пузырьки, это говорит о плохом качестве напитка.**
- 4. На бутылке должна быть акцизная марка, где разборчивыми цифрами указана дата розлива спиртного.**

Обращая внимание на эти небольшие нюансы, можно практически полностью исключить возможность отравления. Если интоксикация все-таки имеет место, следует немедленно обратиться к врачу. Самолечение отравления алкогольными суррогатами тяжелой степени тяжести может привести к плачевным последствиям.